

Actellic 500 EC

Środek przeznaczony do stosowania przez użytkowników profesjonalnych.

Środek owadobójczy w formie koncentratu do sporządzania emulsji wodnej, o działaniu kontaktowym, żołądkowym i gazowym.

Zawartość substancji czynnej: pirymifos metylowy (związek z grupy fosforoorganicznych) – 500 g/l.

Uprawa	Szkodnik	Dawkowanie	Karencja
dezynsekcja pustych pomieszczeń	wołek zbożowy, trojszyk ulec, spichrzeli surynamski	100 m l/100 m 2/1 l wody	nie dotyczy
dezynsekcja nasion siewnych i przeznaczonych do konsumpcji (pszenica, pszenżyto, jęczmień, owies)		8 ml/0,7 5-1 l wody/ 1 tonę nasion	

Prewencja: dla ludzi 7 dni.

Uwagi:

1. Przed przystąpieniem do dezynsekcji szczelnie zamknąć drzwi i okna oraz wyłączyć wentylację.
2. Nie opryskiwać emulsją wodną części maszyn, silników elektrycznych, transmisji przekładniowych itp.
3. Nie opryskiwać obiektów nasłonecznionych.
4. Po dezynsekcji obiekt można oddać do użytku po wyschnięciu opryskanej powierzchni i dokładnym wywietrzeniu pomieszczenia.
5. Środek może gorzej działać w magazynach z cementu włóknistego.
6. W przypadku ochrony składowanego jęczmienia słodowego niezbędne jest przeprowadzenie badań oceniających zdolność słodowania.

Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu.

